


ビタミンE配合



ジャストパップ

膏体と粘着シートの一体構造

うちみ
ねんざ
肩こり
腰 痛



ご使用後はファスナーを軽く押えて閉めてください。





→ 使用後はファスナーを軽く押えて閉めてください。

ジャストパップ(鎮痛消炎薬)

第3類医薬品



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

配置期限

ロット番号

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量

膏体 100.0g 中
dl-カンフル 0.200g

l-メントール 0.300g

サリチル酸グリコール 1.000g

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 0.300g

添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアリミニウム、アミノセテート、モノオレイン酸ソルビタン、香料を含有します。

製造販売元 大協薬品工業株式会社
富山市水橋畠等173

効能又は効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法及び用量

1日1~2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

<用法及び用量に関する注意>

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらくなりすぎる可能性があるので、使用を控えてください。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)開封後はファスナーを閉めて保管してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

電話:076-479-1313

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

8枚入 (11.8cm×7.5cm)

¥1,200 +税

品目番号 追3-74-471

