

イソビタンD²

成分・分量 1日量1本(100mL)中
チアミン硝化物……………10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム…3mg
ピリドキシン塩酸塩………50mg
ニコチン酸アミド……………30mg
無水カフェイン……………50mg
L-アルギニン塩酸塩………40mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・
カリウム……………1000mg
ローヤルゼリー……………50mg
添加物：白糖、D-ソルビトール、
ハチミツ、*dl*-リンゴ酸、クエン酸
水和物、安息香酸Na、エドト酸
Ca/2Na、香料、ビタミンE、パ
ニコリン、エタノール

●本剤に配合されているリボフ
ラビンリン酸エステルナトリ
ウムにより、尿が黄色になる
ことがある。

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本
(100mL)を服用する。

- 用法及び用量を厳守すること。
- 本剤は、まれに沈殿を生じる
ことがある。よく振って服用
すること。

金属：キャップ ガラス：瓶

ローヤルゼリー配合

肉体疲労時の栄養補給

イソビタンD²

第3類医薬品

100mL

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

滋養強壮・虚弱体質

使用上の注意

相談すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は
副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製
品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用
を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談すること

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の
容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質
が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しない
こと。(5)加温、冷凍はさけること。

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931
(お客様相談室)06-6203-5151 受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

KLO4

¥210 (本体価格¥200+消費税¥10)

使用期限

製造番号