

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。  
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

## 頭痛、むくみ、水瀉性下痢

# てんぐ ご れい さん 五苓散(顆粒) 漢方製剤

てんぐ五苓散(顆粒)は、漢方処方五苓散の配合比率にしたがって、5種の生薬末に結合剤(デンプン)を加えて顆粒剤とし、アルミ箔包装による保存の安全と服用、携帯に便利なお薬につくられた漢方製剤です。



### 使用上の注意

#### 相談すること



- 次の人は服用前に医師又は薬剤師等の専門家に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヶ月位(急性胃腸炎に服用する場合には5~6回、水瀉性下痢、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合。

### <成分・分量>

1日量3包(4.8g) 中

成 分	3包中	基 原
タクシャ末	1.40625g	Alismatis Rhizoma オモダカ科。サジオモダカ又はその近縁植物の茎、葉基及び根を殆ど除いた塊茎。
ブクリョウ末	0.84375g	Poria サルノコシカケ科。マツホドの菌核。
ビャクジュツ末	0.84375g	Atractylodis Rhizoma キク科。オケラまたはオオバナオケラの根茎。
ケイヒ末	0.56250g	Cinnamomi Cortex クスノキ科。 Cinnamomum cassia Blume 又はその他同属植物の樹皮をそのまま、又は周皮を多少除いたものである。
チヨレイ末	0.84375g	Polyporus サルノコシカケ科。チヨレイマイタケの菌核。

## <効能・効果>

のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：

頭痛、むくみ、水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり

- のどが渇いて、尿量が少なく・・・この薬は、のどが渇き、尿量が少ない方を目標として用います。のどが渇き、水を飲みたがるそのわりには尿の回数が少ない、又は尿の回数は少なくないが1回の排尿の量が少ない、どうもすっきり出ない感じがする、という方の諸種の疾患に用います。
- 頭痛・・・頭が痛い、頭が重い、頭にお碗をかぶっているような感じのする方で、のどが渇き、尿量が少ない場合に。二日酔い、乗物酔いなどにみられる頭痛、はき気、嘔吐、のどの渇きなどの不快な症状にも用います。
- むくみ・・・顔や体のむくみ（浮腫）に。
- 水瀉性下痢・・・水のような下痢をする方。また小児、幼児の嘔吐を伴う、水のような下痢にも用います。
- 急性胃腸炎・・・吐いたり、水のような下痢をし、のどが渇き、熱感があり、尿量の少ない方。
- 暑気あたり・・・夏期によくみられる症状で、熱感がある、口が渇く、頭痛、吐き下しする場合に。

## <用法・用量>

次の1回量を1日3回、白湯又は常水にて通常食間に服用して下さい。

食間とは・・・食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量
成 人（15歳以上）	1 包
7～14歳	2/3包
4～6歳	1/2包
2～3歳	1/3包
2歳未満	服用しないこと

### 用法・用量についての注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

※ 本剤は天然物（生薬）を用いていますので、原料の相違により顆粒の色が多少異なることがあります。効果に変わりありません。

### お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元  
二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号