

シートパップID

外用鎮痛消炎薬 第2類医薬品

販売名：シートパップID

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 11歳未満の小児。
 2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 3. 連続して2週間以上使用しないこと

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用期限

製造番号

成分及び分量 膏体100g中 インドメタシン0.375g

添加物として、D-ソルビール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、I-メントール、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、エタノール、モノオレイン酸ソルビタン、黄色205号、青色1号を含有します。

効能又は効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲(うちみ)、捻挫

用法及び用量

膏体面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)用法及び用量を厳守してください。(2)11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所(1～2cm角)の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(4)粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないください。(5)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。(6)多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。(7)貼付後、はがす際にまれに粘着シートと膏体部分が分離する場合がありますが、効果に影響はありません。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)開封後はファスナーを閉めて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

●お問い合わせ先 大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 電話 076-479-1313

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋南等173

7枚入(11.9cm×7.7cm)



4 940794 461822



T32